

グリーンエイト[®] 顆粒水和剤

芝用殺菌剤

- ❗ 炭疽病に
- ❗ ブラウンパッチに
- ❗ イエローパッチに
- ❗ ラージパッチに
- ❗ 春はげ症に
- ❗ ヘルミントスポリウム葉枯病に
- ❗ カーブラリア葉枯病に
- ❗ ダラースポット病に

広範囲の病害に効果
高温期のベントグラスにも安全

成分：トルクロホスメチル 50.0% (O-2,6-ジクロロ-p-トリル=O,O-ジメチル=ホスホロチオアート)

ポリオキシンド亜鉛塩 4.5% (ポリオキシンドとして40,000PsDu/g) 鉱物質微粉、界面活性剤 等 45.5% 褐色水利性細粒及び微粒

●特長

グリーンエイト顆粒水和剤は、予防効果と残効性に優れるトルクロホスメチルと、治癒効果に優れるポリオキシンド亜鉛塩を最適の比率でブレンドすることにより、ベントグラスや日本芝の多くの病害を的確に防除します。

■予防効果+治癒効果、即効性+残効性のコンビネーション

対照的な2成分のコンビネーションにより「予防と治癒」「即効と残効」の両面を発揮。速やかに効果が現れ、長く続きます。

■広い範囲の病害に効果

異なる広い抗菌特性の2成分のコンビネーションにより、様々な病害を抑えます。

■安全性の高さ

高温期のベントグラスへの散布でも、薬害が生じないことが、繰り返し確認されています。人畜に対する安全性、水生動物に対する安全性も高く安心です。

■使いやすさ

高度な製剤技術による、粉立ちが少なく、少水量散布にも適応した懸濁しやすい顆粒水和剤です。また、2成分があらかじめ最適な割合でミックスしてあるので、使いやすく安心です。

●使用方法

※印は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害名	希釈倍率	使用液量	使用時期	総使用回数*
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	500倍	0.25L/m ²	発病初期	本剤のみ 5回以内
		1000倍	0.25~0.5L/m ²		
	ヘルミントスポリウム葉枯病、 カーブラリア葉枯病 疑似葉腐病 (春はげ症)	1000倍	0.5L/m ²	休眠期前及び萌芽前	トルクロホスメチルを 含む農薬5回以内
西洋芝 (ベントグラス)	葉腐病 (ブラウンパッチ)、炭疽病、 ダラスポット病	1000倍	0.5L/m ²	発病初期	ポリオキシンドを含む 農薬6回以内
	疑似葉腐病 (イエローパッチ)			秋~春期	

●使用上の注意 (抜粋)

■効果・薬害等の注意

- ・使用前にはラベルを良く読み、ラベルの記載以外には使用しないでください。
- ・本剤の使用にあたっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないよう注意し、初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- ・本剤の所定量を水に薄め、良くかき混ぜてから散布してください。散布液調整後は出来るだけ速やかに散布してください。

■安全使用上の注意

- ・目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には直ちに水洗してください。(弱い刺激性)
- ・かぶれやすい人は取り扱いに十分注意してください。

- ・散布時は保護マスク・手袋・保護衣等を着用してください。
- ・作業後は手足や顔等を石けんでよく洗い、うがいをして衣服を替えてください。
- ・作業時に着用していた衣服等は、他のものと分けて洗濯してください。
- ・公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のないものが散布区域に立ち入らないよう、縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ・空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。

■保管上の注意

- ・本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ・本剤は密封し直射日光を避け食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

製造： レインボー薬品株式会社
〒110-0005 東京都台東区上野1-19-10

販売： 東洋グリーン株式会社
〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-33-8
<https://www.toyo-green.com>