

適用病害及び使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ホセチルを含む農薬の総使用回数
西洋芝 (ペントグラス)	赤焼病 ピシウム病	100倍	発病初期	8回以内	1m ² 当たり0.1L散布	8回以内
		125倍			1m ² 当たり0.25L散布	
		250倍			1m ² 当たり0.5L散布	

有効成分と性状

種類名	ホセチル水和剤
商品名	シグネチャーWDG
有効成分	ホセチル 79.4%
性状	青緑色水和性細粒
荷姿	1kg×10袋

人畜・魚介類に対する安全性(製剤)

人畜毒性 (急性) 普通物*	経口	ラット(♀)	LD ₅₀ >2,000mg/kg
	経皮	ラット(♂)	LD ₅₀ >2,000mg/kg
	皮膚刺激性	ウサギ	刺激性なし
水産動植物に 対する影響	コイ	LC ₅₀ 137mg/L (96hr)	
	オオミジンコ	EC ₅₀ 129mg/L (48hr)	
	藻類	ErC ₅₀ 15.3mg/L (0-72hr)	

*「毒物および劇物取締法」に基づく「毒劇物の指定を受けない物質を示す」

⚠ 效果・薬害等の注意事項

- 散布液を調製する場合、本剤の一部が水面に浮くことがあるので十分攪拌してください。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- 夏期高温時の連用散布は注意してください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守り、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。
(高温・吸湿しやすい条件下では、物理的性状が劣化するおそれがあります。)

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



殺菌剤 芝用

シグネチャー[®]
WDG

予防散布で芝を美しく

登録商標 第5233403号



