













農林水産省登録:第22211号 有効成分:ペンチオピラド 50.0%

人畜毒性:普通物※

※「毒物及び劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、特定毒物、 毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

特長

幅広い病害

本剤はダラースポット病、フェアリーリング病、炭疽病、葉腐病(ブラウンパッチ、ラージパッチ)、雪腐 小粒菌核病、疑似葉腐病(春はげ症、イエローパッチ)、カーブラリア葉枯病(犬の足跡)、さび病、ネクロ スペクトラムを有する。 ティックリングスポット病、デッドスポット病等の幅広い病害に優れた効果を示します。

既存薬剤耐性菌に 有効。

本剤は、既存のベンズイミダゾール系殺菌剤、ストロビルリン系殺菌剤及びEBI剤とは異なる作用 機作を有する新規系統成分・ペンチオピラドを含む殺菌剤です。

予防効果に優れる。

分生胞子の発芽阻害に優れるため、発病前から発病初期の予防的散布が効果的です。 胞子形成 阻害作用が強く、二次感染の防止や、菌糸伸長阻害作用による治療効果も期待できます。

適用病害と使用方法

2023年6月現在

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ペンチオピラドを 含む農薬の総使用回数
西洋芝 (バーミューダグラス	ダラースポッ 病) カーブラリア 横病	2000倍	0.5 <i>l/</i> m²	- 発病 初:	8回以内	散布	8回以内
西洋芝 (ベントグラス	ダラース ポッ ト病	400倍	0.1 <i>l/</i> m²				
			0.5 <i>l/</i> m²				
	フェアリーリング病 炭疽病						
) 葉腐 i(ブラウン病パッチ) デッドス ポッ ト病	2000倍					
	疑似葉腐病 (イエロチ)			秋~春期			
	雪腐小 粒菌 核病	4000	0.106-3	根雪前			
		400倍	0.1 l/m²				
西洋芝 、		2000倍	0.5 <i>l</i> /m²				
(ライグラス)		400倍	0.1 l/m²				
西洋芝 (ブルーグラス		2000倍	0.5 l/m²				
日本芝	疑似葉腐病 (春はげ症)	2000倍	0.25 <i>l</i> /m²	休眠期前			
	葉腐病 ラージパッチ)			発病初			
	カーブラリア 機構		0.25~0.5l/m				
	フェア ーリ ング病 流		0.5 <i>l</i> /mi				
	ネ クロティッ クヴ ス ポッ			秋~春期			
日本芝 (こうらいしば)	ダラース ポッ ト病			発病 初	期		

使用上の注意事項

/\効果・薬害等の注意

- ●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- ●散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
- ●散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- ●薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異な る薬剤との輪番で使用してください。
- ▶蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ●本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初め て使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

/ 公安全使用上の注意



- ●本剤は眼に対して刺激性があるので、散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡を 着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水 洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ●公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散 布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど 配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- ○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- ○容器·空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。
- *本製品は芝用殺菌剤であり、製品ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- *本印刷物は2023年6月現在の資料、情報、データ等に基づいて作成していますが、記載データ及び評価はあくまでも測定値の代表例であり、全ての事例に当てはまるものではありません。



ホ ムペ ジ http://www.mc-ryokka.com/