ユキスター®
水和剤

ダブルでマモロウ。

2種類の有効成分が優れた相乗効果を生み出すユキスター。
「雪腐小粒菌核病」と「紅色雪腐病」の両方に対応した商品です。
グリーンもフェアウェイもユキスターがしっかりと守ります。

殺菌剤
芝　用

®はバイエルグループの登録商標

ユキスター® 水和剤　殺菌剤 芝用

農林水産省登録
第21641号

W効果で「雪腐病」を防除!

2つの有効成分を配合した「ユキスター水和剤」。幅広い防除効果をもつ2種類のパワーが生み出す独自の相乗効果で雪腐病を完全にコントロール。これ1本で大切な芝を確実にキープします。

雪腐小粒菌核病



※平成17年度委託 東日本グリーン研究所

試験地 ‥‥メイプルポイントGC ナセリー、1区5㎡、2反復
試験内容 ‥12月7日、12月19日にユキスター200倍希釈液を0.2ℓ/㎡如雨露で散布
結果 ‥‥‥ユキスターは防除効果 100% と高い効果を示し、薬害もなく実用性が高いと思われた。

紅色雪腐病



試験地 ‥‥平成17年度北海道北広島市輪厚ナセリー、1区4㎡、3反復
試験内容 ‥ユキスターを11月22日に背負い式動力噴霧器を使い200倍希釈液を0.2/㎡散布した。
結果 ‥‥‥紅色雪腐病甚発生条件下で、防除価99.8%と非常に高い防除効果を示した。

- 種 類 名：イプロジオン・テブコナゾール水和剤
- 成　　分：イプロジオン‥‥50%
  テブコナゾール‥‥5%
- 症　　状：類白色水和性粉末（45㎛以下）
- 有効年限：3年
- 毒　　性：普通物
- 荷　　姿：(1kg×5袋)×2

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名		適用病害名	希釈倍数	使用時期
西洋芝(ベントグラス) 西洋芝(ブルーグラス)		雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病	200倍	根雪前
本剤の使用回数	使用方法	イプロジオンを含む農薬の総使用回数	テブコナゾールを含む農薬の総使用回数	
3回以内	1㎡当り0.2ℓ散布	8回以内	6回以内	

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 散布直後の降雨は効果を減ずる可能性があるので、天候を見極めてから散布してください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため過度の連用を避けてなるべく作用性の異なる薬剤と組合わせてローテーションで使用してください。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特にはじめて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 誤飲、誤食などのないように注意してください。
- 桑葉にかからないようにしてください。
- 眼に入らないように注意。散布液調整時には保護眼鏡を着用してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。(強い刺激性)
- 皮膚に付着しないように注意してください。皮膚に付着した場合は直ちに石けんでよく洗い流してください。(弱い刺激性)
- 散布時は農薬用マスク、不透過性手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。
- 散布器具、容器の洗浄水および残りの薬液は河川に流さず、空袋等は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管‥‥密閉し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した場所に保管してください。

◉ 食べられません。
◉ 有効年月日内に使用してください。
◉ 体調の悪いとき、妊娠中、飲食後等は取り扱い及び作業をしないでください。

PROTECTING TOMORROW ...TODAY

バイエルクロップサイエンスでは、将来の世代のニーズを損なうことなく現世代のニーズを満たす、「持続可能な発展」のため、Protecting Tomorrow ... Todayをモットーに様々な活動を実施しています。

自然との共存 / 人の健康と福祉 / 市場・社会とのパートナーシップ

バイエル クロップサイエンス株式会社
エンバイロサイエンス事業本部
〒100-8262 東京都千代田区丸の内1-6-5
【お客様相談室】0120-575-078
www.es.bayer.jp

お問合わせ先

Bayer

(ES-442) CBC 印刷：平成25年9月