

# フルスウィング®

## 顆粒水和剤

### クロチアニジン水和剤

殺虫剤分類 4A

フルスウィングは住友化学(株)の登録商標

Golf Course

100g入

# 幅広い害虫に 高効果と残効性

臭いが  
少ない

あらゆる  
芝生に使える  
(日本芝・西洋芝)



コガネムシ類



シバツトガ



スジキリヨトウ



芝生用

# 殺虫剤



レインボー薬品株式会社

幅広い害虫に高効果と残効性

# フルスウィング®

## 顆粒水和剤

農林水産省登録 第20733号  
成分：クロチアニジン（化管法1種）50.0%  
性状：褐色水和性細粒  
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）  
包装：100g×10×2

### ■特長

#### ① 幅広い殺虫スペクトラム

甲虫目、チョウ目、カメムシ目、バッタ目、アザミウマ目など幅広い害虫に殺虫活性を示すクロチアニジンを有効成分とした殺虫剤です。

#### ② 優れた効果と残効性

コガネムシ類幼虫に対して、散布で優れた残効性を発揮します。

#### ③ 省力的

コガネムシ類幼虫（甲虫目）に長い残効性があり、シバツトガ（チョウ目）との「同時防除」が可能です。

#### フルスウィングで殺虫効果が確認されている害虫

|       |              |             |             |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| 甲虫目   | チビサクラコガネ(幼虫) | ヒラタアコガネ(幼虫) | セマダラコガネ(幼虫) |
|       | ウスチャコガネ(幼虫)  | アシナガコガネ(幼虫) | ヒメコガネ(幼虫)   |
|       | シバオサザウムシ     |             |             |
| チョウ目  | シバツトガ        | スジキリヨトウ     | タマナヤガ(幼虫)   |
| カメムシ目 | チガヤシロオカイガラムシ |             |             |
| バッタ目  | ケラ           |             |             |

#### フルスウィングの環境影響情報

|        |                            |             |
|--------|----------------------------|-------------|
| コイ     | LC <sub>50</sub> (96hr)    | : 85mg/L    |
| オオミジンコ | EC <sub>50</sub> (48hr)    | : 100mg/L   |
| 藻類     | EbC <sub>50</sub> (0~72hr) | : 140mg/L   |
|        | ErC <sub>50</sub> (0~72hr) | : >1000mg/L |

### ■試験成績

#### コガネムシ類

(アシナガコガネ、ヒラタアコガネ)

(社)日本植物防疫協会研究所(H12年)

発生：少発生

品 種：コウライシバ

散布：7月6日

調査：7月28日(22日後)



#### チガヤシロオカイガラムシ

(財)関西グリーン研究所(H21年)

発生：中発生

品 種：コウライシバ

散布：7月14日

調査：9月4日(52日後)



### ■上手な使い方

[成虫発生時期] [幼虫の加害時期] [越冬幼虫の加害時期]

静岡大学廿日出教授図参考

| 対策時期と対象害虫ステージ | 3月 | 4月       | 5月 | 6月     | 7月 | 8月 | 9月       | 10月 | 11月 |
|---------------|----|----------|----|--------|----|----|----------|-----|-----|
|               |    | 前年越冬幼虫対策 |    | 新生成虫対策 |    |    | 成虫及び幼虫対策 |     |     |
| ウスチャコガネ       |    |          |    |        |    |    |          |     |     |
| セマダラコガネ       |    |          |    |        |    |    |          |     |     |
| マメコガネ         |    |          |    |        |    |    |          |     |     |

### ■適用害虫と使用方法

| 作物名 | 適用病害虫名                           | 希釈倍数       | 使用液量     | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | クロチアニジンを含む農薬の総使用回数 |
|-----|----------------------------------|------------|----------|------|---------|------|--------------------|
| 芝   | コガネムシ類幼虫                         | 5000倍      | 0.5~1ℓ/㎡ | 発生初期 | 4回以内    | 散布   | 4回以内               |
|     |                                  | 1000~2000倍 | 0.2ℓ/㎡   |      |         |      |                    |
|     |                                  | 1500~3000倍 | 0.3ℓ/㎡   |      |         |      |                    |
|     | シバツトガ、スジキリヨトウ                    | 1000倍      | 0.1ℓ/㎡   |      |         |      |                    |
|     | シバオサザウムシ、タマナヤガ幼虫、チガヤシロオカイガラムシ、ケラ | 5000倍      | 0.5ℓ/㎡   |      |         |      |                    |

#### ⚠ 効果・薬害等の注意

・使用量、使用時期、使用方法を守る。  
特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

#### ⚠ 安全使用上の注意

- ・誤飲、誤食に注意。
- ・眼に入らないように注意。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける（刺激性）
- ・散布時は、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをして、衣服を換える。
- ・作業時の衣服などは他と分けて洗濯する。
- ・かぶれやすい人は取扱いに十分注意。
- ・薬液にかからないように注意（蚕毒）

- ・ミツバチに対する注意  
①巣箱及びその周辺にかけないようにする。  
②養蜂地区では周辺への飛散に注意し、ミツバチの危害防止に努める。
- ・マルハナバチに影響を及ぼすおそれがあるので注意。
- ・公園などで使用する場合は、散布地区に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。

- ・魚毒性等…使用残りの薬液が生じないように調整し、使いきる。散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。
- ・保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。
- ・火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
- ・漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
- ・移送取扱いは、ていねいに行う。

■使用前にはラベルをよく読む。 ■ラベルの記載以外には使用しない。 ■小児の手の届く所には置かない。

SCC★GROUP  
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10