

エンバー[®]MC

ペルメトリンマイクロカプセル剤

殺虫剤分類 3A

エンバーは住友化学(株)の登録商標

Golf Course

500_{ml}
入

芝の害虫防除は
長く効く液剤タイプの
マイクロカプセルで!!

芝生用
殺虫剤



スジキリヨトウ



シバツトガ



タマナヤガ



エンバー[®]MC

マイクロカプセル剤

農林水産省登録 第18347号
成分:ペルメトリン(PRTR・1種).....10.0%
水、有機溶剤等 90.0%
性状:類白色粘稠液体
毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指していう通称)
包装:500mℓ×20本

エンバーMCはピレスロイド系化合物“ペルメトリン”を有効成分とする殺虫剤で、住友化学が独自の処方により開発した、全く新しいタイプの「マイクロカプセル剤」です

特長

有効成分にピレスロイドを用いたことにより速効性があり、高い効果を発揮します

マイクロカプセル化により残効性、耐雨性を向上し、魚毒性、薬害の軽減を可能にしました

有機リン剤など他剤抵抗性害虫にもよく効きます

薬臭がほとんどなく、プレーヤー、散布作業者に不快感がありません

低温時にも高い効果を発揮します

適用病害虫と使用方法

(2022年6月現在の登録内容)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用方法	総使用回数 [※]
芝	シバツトガ	1,000~2,000	0.3ℓ/㎡	発生初期	散布	3回
	スジキリヨトウ		0.2~0.3ℓ/㎡			
	シバオサゾウムシ成虫		0.3ℓ/㎡			
	タマナヤガ	2,000	0.3ℓ/㎡			
	コガネムシ類幼虫	500	0.5ℓ/㎡			
	ケラ	1,000	1ℓ/㎡ 0.5ℓ/㎡			

※印は収穫物への残留回避のため、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

⚠ 効果・薬害等の注意

・使用量、使用時期、使用方法を守る。
特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。



・ミツバチに対する注意

- ◆巣箱及びその周辺にかからないようにする。
- ◆関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努める。

- ・火災時は適切な保護具を着用し消火剤等で消火に努める。
- ・漏出時は、保護具を着用し布・砂等に吸収させ回収する。
- ・移送取扱いは、ていねいに行う。

魚毒性等…河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意(甲殻類)散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さない。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

治 療 法…メトカルバモール製剤の投与が有効(動物実験で報告)

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

⚠ 安全使用上の注意

- ・公園、堤とうなどで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせない。小児、人畜等に留意する。
- ・桑葉にかからないように注意(蚕毒)

- ラベルをよく読む。記載以外には使用しない。小児の手の届く所には置かない。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 空ビン、罎場などに放置せず、3回以上水洗し(洗浄水はタンクに入れる)、適切に処理する。

販売



レイナー薬品株式会社

東京都台東区上野1-19-10

SCC GROUP
住友化学 アグログループ