



バミューダトライアングル(バミューダグラス) Bermuda Triangle (Bermudagrass)

ターフ形成の速さが緑地造成に活!!

「バミューダトライアングル」は、幅広い環境に適応できる3種を配合したブレンド種子です。構成品種は、モホーク(MOHAWK)、サルタン(SULTAN)、シドニー(SYDNEY)の3種です。

「バミューダトライアングル」の特徴はターフ形成が早く、芝生の緑度が濃く、耐暑性や耐乾性、耐塩性に優れ、スポーツフィールドから公園、緑地や芝生広場の緑化まで多くの使用場面に利用できます。

特 徴

- 品質を重視した「シドニー」「サルタン」、および生育速度・耐旱性・耐寒性が優れる「モホーク」を配合
- 芝生緑度が濃く、密な芝質
- ターフの形成が早く、回復力が優れる
- 踏圧に強く耐久性が高い
- 暑さと乾燥および塩害に強い
- 3種ブレンドの遺伝的多様性により、幅広い環境に適応する
- ブルータグ品質 (生産地のある州の種子品質認証)

使用場面

- ゴルフ場のフェアウェイ、ラフ
- 公園の芝生広場、校庭、法面緑化
- 住宅や商業施設の芝生

使用方法

- 日当たりと排水が良い土壤に適し、地温 18℃以上の条件で播種できる
- 推奨播種量 … 新規造成: 10~15g/m²以上、追い播き補修: 2.5~5g/m²以上
- 播種後の目砂は 3 mm前後が適し、6 mm以上の厚目砂を散布しないこと
- 発芽まで 1~2 週間は土壤水分に注意して毎日散水を行なう
- 地温 18℃以上の条件において、10~14 日で発芽開始、14~18 日で発芽が完了する
- 全体を被覆するのに、4~6 週間を要する
- 刈込作業は午前中を推奨、刈高 30 mm前後で、草丈の 1/3 以上を刈り込まないようにする