



農林水産省登録
第17008号

芝生用薬剤

殺菌剤

芝生用殺菌剤

カブステン®

粒 剤



手軽に使える
粒剤タイプ!

特長



- 1 散布時間の大幅短縮が可能です
- 2 水を使う必要がありません
- 3 降雨後の散布が可能です
- 4 残効性が長く、散布適期幅が広がります

®登録商標



株式会社 二チノ一緑化



成分・性状

種類名：イソプロチオラン・フルトラニル粒剤
 有効成分：イソプロチオラン……………4.0%
 フルトラニル……………5.0%
 性状：淡褐色細粒

安全性

(毒性区分) 普通物	急性経口毒性 (LD ₅₀)	急性経皮毒性 (LD ₅₀)
	ラット♂♀ >5000mg/kg	ラット♂♀ >2000mg/kg
(魚毒性) B類相当	コイ	ミジンコ
	LC ₅₀ (48hr) 200mg/L	LC ₅₀ (3hr) >300mg/L

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用薬量 (g/m ²)	使用時期	総使用回数*			使用方法	
				本剤のみ	イソプロチオラン	フルトラニル		
芝	ベントグラス	40~60	根雪前	4回以内	8回以内	8回以内	散布	
	ブルーグラス							雪腐小粒菌核病
	日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	15~20					発病初期
		フェアリーリング病	40					

※印は本剤およびそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数を示す。

効果・薬害等の注意

- 本剤は有効成分が露や雨の水分により溶出して効果を発揮するので、葉腐病 (ラージパッチ) の防除剤に使用する場合は、降雨の後に散布するのが効果的です。なお、晴天が続くときに使用する場合は散布後散水することをお薦めします。
- 雪腐病に対する散布適期は根雪前30日前後であり、根雪直前のような遅い散布では効果の劣ることがあるので注意してください。

安全使用上の注意

- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分に注意してください。
- 魚毒性:水産動物に影響を及ぼしますが、通常の使用方法では問題ありません。
- 保管:直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。



葉腐病 (ラージパッチ)



張芝ソッドに発生した葉腐病 (ラージパッチ)



フェアリーリング病

- 使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空袋は圃場などに放置せず、廃棄物処理業者に委託する等により適切に処理してください。

取扱店

 株式会社 二チノ一緑化

〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町14-4 岡谷ビルディング6F
 TEL (03) 3808-2281 FAX (03) 3808-2360
 大阪営業所 TEL (072) 727-8015
 ホームページアドレス <http://www.nichino-ryokka.co.jp>