

幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



信頼と実績

オウルラン[®] 水和剤

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性を持ち、作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



オルトラン®水和剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギンウワバ	1000~1500	100~300 ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類 アザミウマ類	1000~2000 1000					
	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500					
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500~2000					
	ヨトウムシ	1000~1500					
レタス	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000					
非結球レタス	ヨトウムシ	1000~1500					
	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000					
カリフラワー	ヨトウムシ						
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、みずな、 ルッコラ、たかなを除く)	アブラムシ類	1500					
	アワノメイガ						
しょうが	アワノメイガ						
ごぼう	アブラムシ類	1000					
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ	1000	25ℓ/10a	収穫開始7日前まで	1回	散布	2回以内 2回以内 (株元散布は1回以内、散布は1回以内)
	アブラムシ類						
ばれいしょ	アブラムシ類、ジャガイモガ	300					
	アブラムシ類、ジャガイモガ						
てんさい	ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500	100~300 ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)
	ヨトウムシ	1000	1.6ℓ/10a				
	ヨトウムシ	16	1.6ℓ/10a				
	トビハムシ類	300	25ℓ/10a				
未成熟とうもろこし	トビハムシ類	60~100	2.5~3ℓ/m ²	育苗期	1回	無人航空機による散布 散布 灌水	4回以内 (育苗期の灌水は1回以内、散布は3回以内)
あずき	アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アズキノメイガ、アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫14日前まで	3回以内		
だいず	アブラムシ類	16	1.6ℓ/10a	収穫60日前まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内
	ハスモンヨトウ、マメシンクイガ アブラムシ類						
えだまめ	アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ						
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500	25ℓ/10a	収穫21日前まで	5回以内	無人航空機による散布	5回以内
	ネギコガ、アブラムシ類	300					
	ネギコガ、アブラムシ類	16					
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
かき	カキダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ	1500	200~700 ℓ/10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	2回以内
	アザミウマ類	2000					
いちじく	チャノキイロアザミウマ	1000~2000	200~400 ℓ/10a	摘採45日前まで	1回	散布	1回
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノコカクモンハマキ	1000~1500					
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	1500	200~700 ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
だいおう	ヨトウムシ	1000					
みしまさいこ	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ/10a	生育期 但し、 収穫230日前まで	3回以内	散布	3回以内
薬用にんじん	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ/10a	収穫30日前まで	5回以内		
ソルガム	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ/10a	収穫180日前まで 収穫30日前まで	3回以内		
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	1000	200~700 ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
葉しょうが	アワノメイガ						
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500	25~180 ℓ/10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ヤサイゾウムシ	1000~2000	1ℓ/m ²	苗床期			
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500~2000	25~180 ℓ/10a	収穫10日前まで			
つつじ類	ツツジシンバイ	1500	200~700 ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
つばき類	チャドクガ	1500					
さくら	モンクロシャチホコ アメリカシロヒトリ	1000~1500 1500~2000					
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1000~1500	100~300 ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	アオムシ、ヨトウムシ類						
きく	マメハモグリハエ、オオタバコガ						
ストック	コナガ、ハイマダラノメイガ						
宿根アスター	ヨメナスジハモグリハエ						
オンシジウム	カイガラムシ類						
カーネーション	コナガ						
ひまわり	タバコガ						
斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類	1000	200~700 ℓ/10a	発生初期	5回以内	散布	5回以内
樹木類	アザミウマ類						
グラジオラス	アザミウマ類		—	植付時	1回	10分間球根浸漬	
芝	シバツトガ、タマナヤガ		0.25~2ℓ/m ²	発生初期	5回以内	散布	5回以内
	スジキリヨトウ、ケラ		1~2ℓ/m ²				
	シバオサゾウムシ成虫		2ℓ/m ²				
	アカフツツリガ		0.5~1ℓ/m ²				
もりあざみ	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回 3回以内
まめ科牧草	アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内		

2018年10月現在の登録内容

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。
 ●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除等関係機関の指導を受けることが望まれます。

アリスタライフサイエンス株式会社
 〒104-6591 東京都中央区明石町8-1
 TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695
 オルトラン水和剤 検索