


幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



オルトラン® 水和剤

30年の実績と信頼

- ① 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- ② 幅広い作物に適用があります。
- ③ 有効成分は優れた浸透移行性をもち作物全体に広がります。
- ④ 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。
- ⑤ オルトラン粒剤との体系防除が可能です。
(詳しくは各薬剤の製品ラベルをご覧ください)

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



オルトラ[®]水和剤 適用害虫と使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数	
なす	アブラムシ類、アザミウマ類	1000～2000	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	
キャベツ	ハスモンヨトウ、オオタバコガ	1000					
	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000～1500					
はくさい	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000	収穫14日前まで				
	カブラハバチ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ	1000～1500					
レタス	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000～2000	収穫14日前まで				
	ヨトウムシ	1000～1500					
非結球レタス	オオタバコガ	1000	収穫21日前まで				
ブロッコリー	ヨトウムシ	1000～1500					
カリフラワー	オオタバコガ	1000	収穫14日前まで	2回以内	2回以内 (は種前及びは種時の処理は合計1回以内)		
だいこん	ヨトウムシ、カブラハバチ	1500					
はつかだいこん	ダイコンシンクイムシ	1500～2000					
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500					
非結球あぶらな 科葉菜類 (ケール、からしな、 みずな、 ルッコラを除く)	アブラムシ類	1500	収穫21日前まで	1回	1回		
かぶ	アオムシ コナガ						
しょうが	アワノメイガ		収穫45日前まで	2回以内	2回以内		
こぼろ	アブラムシ類	1000		1回	2回以内 (株元散布は1回以内、 散布は1回以内)		
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ		収穫7日前まで	4回以内	10a当り25g散布	1回 5回以内 (補付時の処理は1回 以内、補付後は4回以内)	
ばれいしょ	テントウムシダマシ幼虫、ヨトウムシ	1000～1500					
てんさい	アブラムシ類	300	収穫45日前まで	3回以内	無人ヘリコプター散布	4回以内 (育苗期の灌水は1回 以内、散布は3回以内)	
	ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ	1000～1500					
	トビハムシ類	1000					
	ヨトウムシ	16					
トマト	トビハムシ類	60～100	育苗期	1回	1m ² 当り2.5～3g灌注	3回以内	
	アブラムシ類	1000～2000	収穫前日まで	3回以内	散布		
	マメハモグリバエ	1000					
ミニトマト	アブラムシ類	1500	収穫14日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時の処理は1回以内、 定植後は1回以内)	
とうもろこし			収穫7日前まで	2回以内		2回以内	
あすき	フキノメイガ、アブラムシ類	1000	収穫14日前まで	3回以内		3回以内	
やまのいも	ヤマノイモコガ		収穫45日前まで	1回		1回	
だいず	アブラムシ類	16	収穫60日前まで	3回以内		10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	3回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ、アブラムシ類	1000	収穫21日前まで			散布	5回以内
いんげんまめ	アブラムシ類	1000～1500	収穫14日前まで				
たまねぎ	ネギアザミウマ	300	収穫21日前まで	5回以内	10a当り25g散布 10a当り1.6g 無人ヘリコプター散布	5回以内	
		16					
							1000
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内	
ぶどう	チャノキイロアザミウマ、フタテンヒメヨコバイ	1500～2000	収穫30日前まで				
	ハマキムシ類	1500					
かき	カキウダアザミウマ、チャノキイロアザミウマ	1000～1500	収穫45日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	カキノヘタムシガ						
かんきつ	カキノヒメヨコバイ	1000	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内	
	コカクモンハマキ、シャクトリムシ類						
	ヤノネカイガラムシ第1世代、ツノロウムシ						
	ルビーロウムシ、ミカンキイロアザミウマ						
いちじく	ネギアザミウマ、コボウノミドリヒメヨコバイ	1000	収穫45日前まで	1回	散布	1回	
	アブラムシ類、ケシキスイ類	1000～1500					
	コアオハナムグリ、アザミウマ類	1500～2000					
茶	ミカントゲコナジラミ	2000	収穫180日前まで	5回以内	5回以内		
さんしょう(果実)	アブラムシ類	1000	収穫30日前まで	3回以内	3回以内		
だいおう	アブラムシ類	1500	収穫14日前まで	1回	1回		
みしまさいこ	ヨトウムシ	1000	生育期 但し、収穫230日前まで	3回以内	3回以内		
薬用にんじん		1500	収穫30日前まで	5回以内	5回以内		
ソルガム	アブラムシ類	1000	収穫30日前まで	3回以内	3回以内		
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ、アブラムシ類	1500～2500	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	
	ヤサイソウムシ	1000～2000					
	ジャガイモガ若齢幼虫	1500～2000					
つつじ類	ジャガイモガ中齢幼虫		発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
つばき類	ツツジグンバイ	1500					
さくら	チャドクガ	1000～1500					
花き類・ 観葉植物	モンクロシャチホコ	1000～1500	発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
	アメリカシロヒトリ	1500～2000					
きく	アザミウマ類、アブラムシ類	1000～1500	発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
ストック	アオムシ、ヨトウムシ類						
宿根アスター	マメハモグリバエ、オオタバコガ		発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
オンシジウム	コナガ、ハイマダラノメイガ						
カーネーション	ヨメナスジハモグリバエ		発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
ひまわり	カイガラムシ類						
斑入りアマダコロ	コナガ		発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
リアトリス	タバコガ						
樹木類	ハマキムシ類	1000	発生初期	5回以内	5回以内	5回以内	
グラジオラス	アザミウマ類						
芝	アザミウマ類		植付時	1回	10分間球根浸漬	1回	
	シバツグノバイ		発生初期	5回以内	散布	3回以内	
	スジキリヨトウ、ケラ						
	シバオサザシムシ成虫						
アカフツツリガ							
もりあざみ	アブラムシ類	1500	収穫45日前まで	1回	散布	1回	
まめ科牧草	アブラムシ類	1000					3回以内