

予防と治療に優れる
シャープな切れ味

ラージパッチ・春はげ症に

リゾトップ[®]



住化グリーン株式会社

芝用殺菌剤

リゾトップ[®]

農林水産省登録 第22982号

成 分：フラメトビル 50.0%

性 状：類白色水和性細粒

毒 性：普通物

(毒劇物に該当しないものを指す通称)

包 装：500g×4袋

特 長

優れた予防・
治療効果があります。


長い残効性で、
長期間病害の
発生を抑えます。

高い吸収移行性で、
耐雨性に優れます。


適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	使用量		使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	フラメトビルを含む 農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
日本芝	葉腐病 (ラージパッチ)	0.15g/m ²	0.2~0.3 ℓ/m ²	発病初期	2回以内	散布	2回以内
	疑似葉腐病 (春はげ症)	0.1g/m ²	0.1~0.3 ℓ/m ²		休眠期前		

使用適期



ラージパッチへの効果



⚠ 使用上の注意

- 使用量にあわせ薬液を調製し、使いきってください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 誤飲、誤食などの無いよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 敷布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意してください。
- 公園等で使用する場合は、散布中および散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のないものが散布区域に立ち入らないよう縄張いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払ってください。

保管：直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載以外には使用しないでください。 ● 小児の手の届く所には置かないでください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



住化グリーン株式会社

〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町1番8号
TEL.(03)6837-9422 FAX.(03)6837-9423
<http://www.sumika-green.jp>