

シバキープセ이버[®]

イマゾスルフロン水和剤

Golf Course



日本芝・西洋芝の雑草対策に!

芝生用

除草剤

殺草スペクトラム(発生初期処理)

対象雑草	キク科												ナデシコ科	タデ科		トウダイグサ科	マメ科	ウコギ科	カタバミ科	アブラナ科	オオバコ科	カヤツリグサ科	ナス科	ヒユ科					
	ウラジロチチコグサ	トキンソウ	ヨモギ	ヒメムカシヨモギ	ハキダメギク	セイヨウタンポポ	セイタカアワダチソウ	アレチノギク	オオアレチノギク	ブタナ	マメカミツレ	タビラコ	オランダミミナグサ	ツメクサ	イヌタデ	スイバ	イタドリ	コニシキソウ	コメツブツメクサ	ヤハズソウ	チドメグサ	カタバミ	タネツケバナ	オオイヌノフグリ	ヒメクグ	トキワハゼ	ワルナスビ	シロザ	
0.2㎡処理量 (g/m)	春夏 □ ●	春夏 ●	春夏 □	春夏 ○ ●	秋冬 ●	春夏 ●	秋冬 ○ ●	春夏 ○	秋冬 ●	秋冬 ●	秋冬 ●	秋冬 ●	秋冬 ●	春夏 ●	春夏 ●	秋冬 ●	秋冬 ●	春夏 ●	春夏 ○	春夏 □	春夏 ○ ●	秋冬 ○	春夏 ●	秋冬 ●	秋冬 ●	春夏 □ ○	春夏 ○ ●	春夏 ●	秋冬 ●

評価	●	◎	○	□	△	×
除草効果	100	99~95	94~90	89~70	69~50	49以下

社内試験結果および
日本植物調節剤研究会委託試験結果より



レインボー薬品株式会社

シバキープセイバー[®]

水和剤

農林水産省登録 第24243号
成分：イマズスルフロン 40.0%
性状：類白色水和性粘稠懸濁液体
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）
包装：500mℓ×8本

特長



ヒメクグ・チドメグサに効果

西洋芝にも使用できる
(ブルーグラス・ベントグラス)

※注意点：ベントグラスの根の生育を抑制するリスクがあるので灌水に注意して下さい。

広葉雑草に幅広い
殺草スペクトラム

◆適用雑草と使用方法

※本剤及び本有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		使用方法	総使用回数*
			薬量	希釈水量		
日本芝 (こうらいしば)	多年生広葉雑草	芝生育期 (雑草発生初期)	200mℓ/10a	200~300 ℓ/10a	雑草茎葉散布	3 回
日本芝 西洋芝 (ブルーグラス) 西洋芝 (ベントグラス)	一年生広葉雑草 ヒメクグ					

⚠ 効果・薬害等の注意

- ・使用量に合わせ薬液を調製し、使いきって下さい。
- ・貯蔵しておくとき分離するので、使用の際にはよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取り出して下さい。希釈する場合は所定量の水に加えて十分にかくはんして下さい。
- ・雑草発生初期に有効なので時期を失しないように散布して下さい。
- ・イネ科雑草に効果が劣るので、イネ科雑草の多い場合はこれに有効な土壌処理剤との混用または体系で使用して下さい（効果）

- ・散布時は芝生の付近にある草花や花木、畑作物などに薬液がかからないようにして下さい（薬害）
- ・張り芝直後の芝には使用しないで下さい（薬害）
- ・散布に用いた器具類は、使用后直ちに洗浄し、他の用途に使用する場合の薬害の原因にならないように注意して下さい。
- ・使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。特に初めて使用する場合や異常気象時は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- ・公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中及び散布後（最小限その当日）に関係者以外は立ち入らせないで下さい。小児、人畜等に留意して下さい。
- ・魚毒性等…散布器具・容器の洗浄水は、河川等に流さないで下さい。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理して下さい。
- ・保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所。空容器は圃場などに放置せず適切に処理して下さい。

■使用前にはラベルをよく読んでください。■ラベルの記載以外には使用しないでください。■小児の手の届く所には置かないでください。

SCC GROUP
住友化学 アグログループ



レインボー薬品株式会社

東京都台東区上野 1-19-10
TEL. (03) 6740-7777 FAX. (03) 6740-7000