

適用病害及び使用方法

| 作物名                | 適用病害名    | 希釈倍数 | 使用方法                | 使用時期     | 本剤の使用回数 |
|--------------------|----------|------|---------------------|----------|---------|
| 西洋芝<br>(ベントグラス)    | 炭疽病      | 50倍  | 0.1L/m <sup>2</sup> | 発病前～発病初期 | 2回      |
|                    |          | 100倍 | 0.2L/m <sup>2</sup> |          |         |
|                    | ダラースポット病 | 50倍  | 0.1L/m <sup>2</sup> |          |         |
|                    |          | 100倍 | 0.2L/m <sup>2</sup> |          |         |
| 西洋芝<br>(パーミューダグラス) | ダラースポット病 | 50倍  | 0.1L/m <sup>2</sup> |          |         |
|                    |          | 100倍 | 0.2L/m <sup>2</sup> |          |         |

エクステリスフロアブルとは

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 種類名     | フルオピラム・トリフロキシストロピン水和剤                    |
| 有効成分    | フルオピラム…1.19%<br>トリフロキシストロピン(化管法1種)…1.92% |
| 作用性グループ | 呼吸SDHI Complex II<br>Qoi Complex III     |
| 性状      | 暗青緑色水和性粘稠懸濁液体                            |
| 荷姿      | 5L×4本                                    |

人畜・水産動物に対する安全性(製剤)

|                 |        |         |                                 |
|-----------------|--------|---------|---------------------------------|
| 急性毒性<br>普通物*    | 経口     | ラット(♀)  | LD <sub>50</sub> >2,000mg/kg    |
|                 | 経皮     | ラット(♂♀) | LD <sub>50</sub> >2,000mg/kg    |
|                 | 皮膚刺激性  | ウサギ     | 軽度刺激性あり                         |
| 水産動植物に<br>対する影響 | ニジマス   |         | LC <sub>50</sub> 1.42mg/L (96h) |
|                 | オオミジンコ |         | EC <sub>50</sub> 0.75mg/L (48h) |
|                 | 淡水性緑藻  |         | EC <sub>50</sub> 5.25mg/L (72h) |

\*「毒物および劇物取締法」に基づく毒劇物の指定を受けない物質を示す

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 散布後、散布液が乾燥する前にゴルフプレイヤーなど他者が立ち入ると、靴や衣服および所有物を汚損(着色)するおそれがあるので注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全にお使いいただくために   

- 桑葉にかからないようにしてください。
- 眼に刺激性がありますので、眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 皮ふに弱い刺激性がありますので、皮ふに付着しないように注意してください。皮ふに付いた場合は直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際には農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに、保護クリームを使用して下さい。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをして、衣服を換えてください。

- かぶれやすい人は取扱いに十分注意してください。
- 公園などで使用する場合、散布区域に縄囲いや立て札をたて、散布中および散布後(最小限その当日)に関係者以外は立ち入らせないようにしてください。小児、人畜等に留意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製し、使い切ってください。空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。

水産動植物の被害防止等に関する注意事項

- 水産動植物(魚類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。洗浄水は散布液調製に用いるなど、ほ場等で使用して下さい。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して冷涼な所に密栓して保管してください。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載内容以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。



エンバイロサイエンスジャパン株式会社

〒100-0004  
東京都千代田区大手町 1-6-1  
www.jp.envu.com



お問い合わせ先

殺菌剤

芝用



2つの成分が強さを発揮  
新しいストレスガード製剤で安心のグリーン管理

登録商標 第6513518号





# 新しいストレスガード製剤は芝への 安全性が高くローテーション散布に最適

## 特長

- 新規でユニークなSDHI剤であるフルオピラムと信頼のQoI剤トリフロキシストロピンの混合剤 (非DMI (EBI) 混合剤)
- しつこいダラスポット病を防除
- 製剤改良で展着性の向上と散布後の乾きの早さを実現
- 芝に対する高い安全性

### ストレスガード製剤技術とは？

ストレスガード製剤技術は、UVBを効果的に遮断しつつ光障害を緩和する、Envuの独自技術です。この製剤技術を用いた殺菌剤を使用することにより、病害の防除はもちろん、芝のストレス軽減や色合いの向上など、ターフクオリティを向上させることが可能となります。

## ストレスガード製剤とは…

