

総合殺菌剤

大切な芝生と花や木に！


# オーソサイド®

## 水和剤80

葉腐病 (ブラウンパッチ)



赤焼病 (ピシウムブライト)



西洋芝のコケ類にも  
適用拡大！

# リゾクトニアに！ ピシウムに！

## さらに頼れる一剤

成分：キャプタン（N-トリクロロメチルチオテトラヒドロフタルイミド）80% 鉱物質微粉等 20%

## ●特長

- オーソサイド水和剤80は、世界で広く長く使用されている総合殺菌剤です。
- 日本では発売以来60年以上にわたり、汎用性の高い基幹剤として使用され続けています。
- 芝の他にも、果樹、野菜、花き類などの多くの作物の広範囲の病害に安定した予防効果を示します。
- 有効成分のキャプタンは、病原菌の多作用点を阻害するため薬剤耐性が発達するリスクが低く、耐性菌対策としても有効です。

## ●使用方法

\*本剤は多くの果樹・野菜などの病害に登録がありますが、本パンフレットでは芝についてのみ表示しています。

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍率	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
芝	葉腐病 (ブラウンパッチ)	300~500倍	0.5~2L/m <sup>2</sup>	発病初期	8回以内	散布	8回以内
		500~800倍	1~2L/m <sup>2</sup>				
	赤焼病	300~800倍					
西洋芝 (ベントグラス)	炭疽病	300~500倍	0.5L/m <sup>2</sup>				

## 適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	キャプタンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
西洋芝 (ベントグラス)	藻類 コケ類	芝生育期 (藻類発生初期)	1~2g/m <sup>2</sup>	0.5L/m <sup>2</sup>	8回以内	散布	8回以内

## ●使用上の注意 (抜粋)

## ■安全使用上の注意

- ・誤飲、誤食などのないよう注意してください。
- ・本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- ・薬液調製時及び使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
- ・作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- ・かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物との接触を避けてください。
- ・公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が、散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。

- ・水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用を避けてください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- ・直射日光を避け、密閉して冷暗所に食品・飲料と区別して、子供の手の届かない所に保管してください。

## ■効果・薬害等の注意

- ・本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ・石灰硫黄合剤、ボルドー液等のアルカリ性薬剤及びマシン油剤との混用は避けてください。
- ・夏期高温時の使用を避けてください。

製造：アスタライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1

<http://arystalifescience.jp/>

販売：東洋グリーン株式会社

〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-33-8

<https://www.toyo-green.com>